




Copaifera langsdorffii Desf.

FAMÍLIA	Fabaceae
NOME POPULAR	Copaíba
FENOLOGIA	
🌸 Floração:	Dezembro a Março
🍏 Frutificação:	Fevereiro a Maio
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E ECOLÓGICAS	Árvore de grande porte, folhas compostas paripenadas, tronco produtor de óleo-resina e ampla distribuição em Cerrado e florestas.

DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL	Estados:	Bioma:	Status de conservação:	Origem:
	BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RS, SP, TO	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica	Não Avaliado (NE)	Nativa
DADOS DO INVENTÁRIO FLORESTAL NACIONAL (IFN)	Quantidade de indivíduos medidos no Brasil:	Quantidade de coleta botânicas:	Altura média no Brasil (m.):	DAP médio no Brasil (cm.):
	2074	295	10,85	19,56

DISTRIBUIÇÃO DA ESPÉCIE EM UNIDADES AMOSTRAIS NAS COLETAS DO IFN:

- OCORRÊNCIAS IFN
- LIMITES ESTADUAIS
- BIOMAS
 - AMAZÔNIA
 - CAATINGA
 - CERRADO
 - MATA ATLÂNTICA
 - PAMPA
 - PANTANAL



Acesse a página do **SNIF** para ter acesso a mais informações sobre a diversidade de árvores no complexo SFB/IBAMA:
[Inventário Florestal no SFB](#)

Acesse o banco de dados do **Laboratório de Produtos Florestais** para mais informações sobre as propriedades de madeiras brasileiras:
[Banco de dados Madeiras Brasileiras](#)