



Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.)

L.P.Queiroz

FAMÍLIA	Fabaceae
NOME POPULAR	Pau-ferro
FENOLOGIA	
🌸 Floração:	Outubro a Janeiro
🍏 Frutificação:	Dezembro a Abril
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E ECOLÓGICAS	Árvore de madeira dura, folhas bipinadas e tronco manchado, comum na Caatinga e áreas urbanas.

DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL	Estados:	Bioma:	Status de conservação:	Origem:
	AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE	Caatinga	Não Avaliado (NE)	Nativa
DADOS DO INVENTÁRIO FLORESTAL NACIONAL (IFN)	Quantidade de indivíduos medidos no Brasil:	Quantidade de coleta botânicas:	Altura média no Brasil (m.):	DAP médio no Brasil (cm.):
	197	82	6,43	14,89

DISTRIBUIÇÃO DA ESPÉCIE EM UNIDADES AMOSTRAIS NAS COLETAS DO IFN:

- OCORRÊNCIAS IFN
- LIMITES ESTADUAIS
- BIOMAS
 - AMAZÔNIA
 - CAATINGA
 - CERRADO
 - MATA ATLÂNTICA
 - PAMPA
 - PANTANAL



Acesse a página do **SNIF** para ter acesso a mais informações sobre a diversidade de árvores no complexo SFB/IBAMA:
[Inventário Florestal no SFB](#)

Acesse o banco de dados do **Laboratório de Produtos Florestais** para mais informações sobre as propriedades de madeiras brasileiras:
[Banco de dados Madeiras Brasileiras](#)