



Hymenaea courbaril L.

FAMÍLIA	Fabaceae
NOME POPULAR	Jatobá, jatobá-da-mata
FENOLOGIA	
🌸 Floração:	Setembro a Novembro
🍏 Frutificação:	Outubro a Agosto
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E ECOLÓGICAS	Árvore grande, folhas bifolioladas coriáceas e frutos lenhosos com polpa farinácea, típica de florestas tropicais.

DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL	Estados:	Bioma:	Status de conservação:	Origem:
	AC, AM, AP, PA, RO, RR, TO, AL, BA, CE, MA, PB, PE, PI, RN, SE, DF, GO, MS, MT, ES, MG, RJ, SP, PR	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal.	Pouco Preocupante (LC)	Nativa
DADOS DO INVENTÁRIO FLORESTAL NACIONAL (IFN)	Quantidade de indivíduos medidos no Brasil:	Quantidade de coleta botânicas:	Altura média no Brasil (m.):	DAP médio no Brasil (cm.):
	1370	156	12,29	22,15

DISTRIBUIÇÃO DA ESPÉCIE EM UNIDADES AMOSTRAIS NAS COLETAS DO IFN:

- OCORRÊNCIAS IFN
- LIMITES ESTADUAIS
- BIOMAS
- AMAZÔNIA
- CAATINGA
- CERRADO
- MATA ATLÂNTICA
- PAMPA
- PANTANAL



Acesse a página do **SNIF** para ter acesso a mais informações sobre a diversidade de árvores no complexo SFB/IBAMA: [Inventário Florestal no SFB](#)

Acesse o banco de dados do **Laboratório de Produtos Florestais** para mais informações sobre as propriedades de madeiras brasileiras: [Banco de dados Madeiras Brasileiras](#)