



Moquilea tomentosa Benth.

FAMÍLIA	Chrysobalanaceae
NOME POPULAR	Oiti
FENOLOGIA	
🌸 Floração:	Agosto a Outubro
🍏 Frutificação:	Outubro a Fevereiro
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E ECOLÓGICAS	Árvore de Cerrado, folhas simples com face inferior tomentosa e frutos drupáceos.

DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL	Estados:	Bioma:	Status de conservação:	Origem:
	AL, BA, CE, PB, PE, PI, RN, SE	Mata Atlântica	Pouco Preocupante (LC)	Nativa
DADOS DO INVENTÁRIO FLORESTAL NACIONAL (IFN)	Quantidade de indivíduos medidos no Brasil:	Quantidade de coleta botânicas:	Altura média no Brasil (m.):	DAP médio no Brasil (cm.):
	10	10	8,86	16,75

DISTRIBUIÇÃO DA ESPÉCIE EM UNIDADES AMOSTRAIS NAS COLETAS DO IFN:

- OCORRÊNCIAS IFN
- LIMITES ESTADUAIS
- BIOMAS
 - AMAZÔNIA
 - CAATINGA
 - CERRADO
 - MATA ATLÂNTICA
 - PAMPA
 - PANTANAL



Acesse a página do **SNIF** para ter acesso a mais informações sobre a diversidade de árvores no complexo SFB/IBAMA:

[Inventário Florestal no SFB](#)

Acesse o banco de dados do **Laboratório de Produtos Florestais** para mais informações sobre as propriedades de madeiras brasileiras:

[Banco de dados Madeiras Brasileiras](#)