




Plathymenia reticulata Benth.

FAMÍLIA	Fabaceae
NOME POPULAR	Vinhático
FENOLOGIA	
🌸 Floração:	Agosto a Outubro
🍏 Frutificação:	Outubro a Janeiro
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E ECOLÓGICAS	Árvore de Cerrado, folhas bipinadas e frutos achatados alados.

DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL	Estados:	Bioma:	Status de conservação:	Origem:
	BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, PR, RJ, SP, TO	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica	Pouco Preocupante (LC)	Nativa
DADOS DO INVENTÁRIO FLORESTAL NACIONAL (IFN)	Quantidade de indivíduos medidos no Brasil:	Quantidade de coleta botânicas:	Altura média no Brasil (m.):	DAP médio no Brasil (cm.):
	1710	227	7,24	16,19

DISTRIBUIÇÃO DA ESPÉCIE EM UNIDADES AMOSTRAIS NAS COLETAS DO IFN:

- OCORRÊNCIAS IFN
- LIMITES ESTADUAIS
- BIOMAS
 - AMAZÔNIA
 - CAATINGA
 - CERRADO
 - MATA ATLÂNTICA
 - PAMPA
 - PANTANAL



Acesse a página do **SNIF** para ter acesso a mais informações sobre a diversidade de árvores no complexo SFB/IBAMA:

[Inventário Florestal no SFB](#)

Acesse o banco de dados do **Laboratório de Produtos Florestais** para mais informações sobre as propriedades de madeiras brasileiras:

[Banco de dados Madeiras Brasileiras](#)