



Schinus terebinthifolia Raddi

FAMÍLIA	Anacardiaceae
NOME POPULAR	Aroeira
FENOLOGIA	
🌸 Floração:	Agosto a Novembro
🍏 Frutificação:	Outubro a Fevereiro
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E ECOLÓGICAS	Arbusto ou árvore pioneira, folhas compostas aromáticas e frutos vermelhos, comum em restingas e áreas degradadas.

DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL	Estados:	Bioma:	Status de conservação:	Origem:
	AL, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, SC, SP, SE, TO	Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa	Não Avaliado (NE)	Nativa
DADOS DO INVENTÁRIO FLORESTAL NACIONAL (IFN)	Quantidade de indivíduos medidos no Brasil:	Quantidade de coleta botânicas:	Altura média no Brasil (m.):	DAP médio no Brasil (cm.):
	70	7	6,66	15,51

DISTRIBUIÇÃO DA ESPÉCIE EM UNIDADES AMOSTRAIS NAS COLETAS DO IFN:

- OCORRÊNCIAS IFN
- LIMITES ESTADUAIS
- BIOMAS
 - AMAZÔNIA
 - CAATINGA
 - CERRADO
 - MATA ATLÂNTICA
 - PAMPA
 - PANTANAL



Acesse a página do **SNIF** para ter acesso a mais informações sobre a diversidade de árvores no complexo SFB/IBAMA: [Inventário Florestal no SFB](#)

Acesse o banco de dados do **Laboratório de Produtos Florestais** para mais informações sobre as propriedades de madeiras brasileiras: [Banco de dados Madeiras Brasileiras](#)