



Tabebuia roseoalba (Ridl.)

Sandwith

FAMÍLIA	Bignoniaceae
NOME POPULAR	Ipê-branco
FENOLOGIA	
🌸 Floração:	Agosto a Setembro
🍏 Frutificação:	Setembro a Novembro
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E ECOLÓGICAS	Árvore caducifólia, flores branco-rosadas e folhas palmadas, típica de florestas sazonais.

DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL	Estados:	Bioma:	Status de conservação:	Origem:
	AL, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, SE, SP, TO	Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica	Não Avaliado (NE)	Nativa
DADOS DO INVENTÁRIO FLORESTAL NACIONAL (IFN)	Quantidade de indivíduos medidos no Brasil:	Quantidade de coleta botânicas:	Altura média no Brasil (m.):	DAP médio no Brasil (cm.):
	915	203	9,01	15,65

DISTRIBUIÇÃO DA ESPÉCIE EM UNIDADES AMOSTRAIS NAS COLETAS DO IFN:

- OCORRÊNCIAS IFN
- LIMITES ESTADUAIS
- BIOMAS
- AMAZÔNIA
- CAATINGA
- CERRADO
- MATA ATLÂNTICA
- PAMPA
- PANTANAL



Acesse a página do **SNIF** para ter acesso a mais informações sobre a diversidade de árvores no complexo SFB/IBAMA:

[Inventário Florestal no SFB](#)

Acesse o banco de dados do **Laboratório de Produtos Florestais** para mais informações sobre as propriedades de madeiras brasileiras:

[Banco de dados Madeiras Brasileiras](#)