




Tapirira guianensis Aubl.

FAMÍLIA	Anacardiaceae
NOME POPULAR	Pau-pombo
FENOLOGIA	
🌸 Floração:	Junho a Fevereiro
🍏 Frutificação:	Outubro a Fevereiro
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS E ECOLÓGICAS	Árvore pioneira de florestas úmidas, folhas compostas e frutos pequenos dispersos por aves.

DISTRIBUIÇÃO NO BRASIL	Estados:	Bioma:	Status de conservação:	Origem:
	AC, AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, SC, SE, SP, TO	Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal	Não Avaliado (NE)	Nativa
DADOS DO INVENTÁRIO FLORESTAL NACIONAL (IFN)	Quantidade de indivíduos medidos no Brasil:	Quantidade de coleta botânicas:	Altura média no Brasil (m.):	DAP médio no Brasil (cm.):
	4833	566	10,65	18,23

DISTRIBUIÇÃO DA ESPÉCIE EM UNIDADES AMOSTRAIS NAS COLETAS DO IFN:

- OCORRÊNCIAS IFN
- LIMITES ESTADUAIS
- BIOMAS
- AMAZÔNIA
- CAATINGA
- CERRADO
- MATA ATLÂNTICA
- PAMPA
- PANTANAL



Acesse a página do **SNIF** para ter acesso a mais informações sobre a diversidade de árvores no complexo SFB/IBAMA: [Inventário Florestal no SFB](#)

Acesse o banco de dados do **Laboratório de Produtos Florestais** para mais informações sobre as propriedades de madeiras brasileiras: [Banco de dados Madeiras Brasileiras](#)